GRAVI ALLERGIE

Dipartimento di Prevenzione
Direzione Sanitaria
AAS 5 "Friuli Occidentale"

ALLERGIA

risposta anomala e dannosa dei meccanismi di difesa dell'organismo verso particolari sostanze, che risultano innocue per la maggior parte della popolazione, e sono normalmente presenti nell'ambiente

Sistema immunitario

- riconosce l'allergene (proteina) come estraneo
- produce una risposta abnorme e non controllata

IMMUNITA': è la capacità di difesa contro un ANTIGENE

IL SISTEMA IMMUNITARIO

LE ALLERGIE sono difese esagerate

Si attivano quando un antigene, normalmente innocuo, diventa **ALLERGENE**

Il Sistema Immunitario si attiva in modo esagerato e pericoloso

Specifiche sostanze stimolano La produzione di **ANTICORPI (IgE)**

Le **IgE** si legano a specifici Globuli Bianchi detti **MASTCELLULE**

Le Mastcellule liberano **ISTAMINA** che causa la **REAZIONE ALLERGICA**

ANTIGENE

Proteine o polisaccaridi

1. Origine microbica
2. Origine non microbica

Molecola in grado di legarsi a specifici componenti del sistema immunitario, (anticorpi o cellule immunocompetenti),

ALLERGENE

Proteine o glicoproteine o apteni che stimolano in modo abnorme il sistema immunitario tramite reazioni mediate dagli anticorpi di tipo IgE

Classificazione:

1. allergeni da inalazione :
pollini, muffe,
dermatofagoidi, ecc.
2. allergeni da ingestione :
alimenti, farmaci, ecc.
3. allergeni da iniezione o da
puntura : farmaci, veleni di
insetti, ecc.
4. allergeni da contatto:
cosmetici, metalli, ecc.

apis mellifera

vespa crabro

vespula germanica

polistes

CASCATA ALLERGICA

CLINICA

Sintomi respiratori:

rinite, tosse, difficoltà respiratoria con fischi e sibili (broncospasmo)

CLINICA

Cute e mucose:

congiuntivite,
edema delle labbra,
orticaria,
angioedema,
eczema/ dermatite
atopica

Congiuntivite

Angioedema

Urticaria

Eczema

CLINICA

Apparato gastroenterico:

nausea,
vomito,
diarrea,
dolori addominali

SHOCK ANAFILATTICO

Lo Shock Anafilattico è la forma più grave di reazione allergica e pertanto richiede un trattamento tempestivo.

Può essere dovuta a diverse cause:

- alimenti (latte, uovo, pesce, crostacei, arachidi, noci, kiwi,...)
- farmaci (antibiotici, antinfiammatori),
- punture di insetto (api, vespe, calabroni)

I sintomi solitamente insorgono immediatamente, comunque entro 30 minuti dal contatto con l'allergene. In rari casi l'insorgenza è più ritardata, ma sempre inferiore alle 2 ore.

CLINICA

- **Sintomi iniziali (che non devono essere sottovalutati):** sensazione di formicolio, prurito cutaneo, senso di calore diffuso al corpo, sapore metallico in bocca, formicolio alla gola
- **Sintomi conclamati:** eritema diffuso, orticaria, dolori addominali, vomito, diarrea, gonfiore delle labbra e della lingua, senso di costrizione alla gola, secrezione nasale, battito cardiaco accelerato, senso di svenimento
- **Sintomi successivi:** difficoltà respiratoria con senso di soffocamento, perdita di coscienza, collasso cardio-circolatorio da caduta della pressione arteriosa

TERAPIA

- antistaminico
- cortisone
- **ADRENALINA**

Fonte: “Eventi Sanitari e Farmaci a Scuola”
a cura dell’U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
AULSS5 “Ovestvicentino”, Direzione di Distretto

FASTJEKT

- Siringa autoiniettabile per via intramuscolare predosata
- Adrenalina
- 2 dosaggi:
 - 10-30 kg peso 165 mcg
 - >30 kg peso 330 mcg
- Conservare in luogo fresco e asciutto a riparo della luce
- Temperatura <25°C

Fonte: “**Eventi Sanitari e Farmaci a Scuola**”
a cura dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
AULSS5 “Ovestvicentino”, Direzione di Distretto

FASTJEKT

1

Estrarre
l'autoiniettore
dal contenitore

2

Rimuovere il
cappuccio blu
di sicurezza

3

Tenere l'estremità
arancione a circa 10
cm dalla parte esterna
della coscia,
premere con forza
(si sentirà lo scatto
dell'ago)
e tenere in sede per 10
secondi

Si effettua in questo
modo una iniezione
intramuscolare

Cappuccio di sicurezza

Prima dell'uso

Dopo l'uso

Fonte: "Eventi Sanitari e Farmaci a Scuola"
a cura dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
AULSS5 "Ovestvicentino", Direzione di Distretto

ANTISTAMINICO, CORTISONE, BRONCODILATATORE

AZIONI

- Documentazione e procedure secondo Protocollo d'Intesa "Verso una scuola che promuove salute" → indicazioni nazionali
 - **Tenere sempre il farmaco il più vicino possibile al soggetto allergico**
 - Favorire l'attività fisica del bambino/ragazzo avendo l'accortezza di avere con sé i farmaci necessari
 - Assicurarsi di avere sempre i farmaci necessari in caso di uscite → ASTUCCIO TERMICO CONTENENTE FARMACI E DOCUMENTI
 - **Buona comunicazione scuola-famiglia su storia clinica e terapia in atto**
-

AZIONI IN CASO DI SHOCK ANAFILATTICO

- Rassicurare il bambino/ragazzo
- Chiedere aiuto
- Orologio
- Somministrare antistaminico ed eventuale cortisone se:
 - previsto dal certificato medico
 - soggetto in grado di assumere sostanze per bocca

- Posizione supina e poi a gambe sollevate
- Somministrazione **Adrenalina** come da certificato medico se **sintomatologia progredisce**
- Contattare immediatamente il **118**
- Avvertire i genitori

Fonte: “Eventi Sanitari e Farmaci a Scuola”
a cura dell’U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia
AULSS5 “Ovestvicentino”, Direzione di Distretto

SOMMINISTRAZIONE

I farmaci a scuola non devono essere somministrati agli studenti, salvo i casi autorizzati dai genitori (o dagli studenti stessi se maggiorenni), quando siano presenti le condizioni seguenti:

1. assoluta necessità,
2. somministrazione indispensabile in ambito scolastico,
3. non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
4. presenza di personale non sanitario addestrato

PROTOCOLLO D'INTESA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Gruppo di lavoro: Eleonora Biasotto, Michele Minuzzo, Silvana Widmann, Carmen Zampis